

## Referencia rápida sobre los síntomas:

### Cuándo debe llamar a su equipo de atención médica

Síntomas	Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias	Llame a su equipo de atención médica: 732-235-2465
<b>Alerta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ No se puede levantar ni despertar.</li> <li>◆ Tiene convulsiones.</li> <li>◆ Perdió el movimiento en alguna parte del cuerpo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene más o nuevos episodios de confusión.</li> <li>◆ Experimenta cambios en la visión.</li> <li>◆ Se cae.</li> <li>◆ Episodios nuevos de entumecimiento u hormigueo.</li> <li>◆ Tiene mareos.</li> <li>◆ Sufre cambios importantes en el estado de ánimo.</li> <li>◆ Tiene insomnio.</li> <li>◆ Tiene letargo (fatiga extrema).</li> <li>◆ Tiene temblores/escalofríos.</li> </ul>
<b>Sangrado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene sangrado incontrolable.</li> <li>◆ Vomita con sangre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene una hemorragia nueva o más intensa.</li> <li>◆ Orina con sangre.</li> <li>◆ Tose con sangre.</li> <li>◆ Tiene hemorragias nasales.</li> <li>◆ Despide heces oscuras o con sangre.</li> <li>◆ Usa una o más toallas femeninas por hora.</li> <li>◆ Presenta hematomas nuevos.</li> <li>◆ Presenta pequeñas manchas rojas o púrpuras en la piel.</li> <li>◆ Tiene sangrado en las encías.</li> </ul>
<b>Respiración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene dificultad para respirar.</li> <li>◆ Se asfixia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene problemas para respirar cuando está recostado.</li> <li>◆ Tiene sibilancia.</li> <li>◆ Tiene tos continua nueva o persistente.</li> <li>◆ Aumento de la falta de aliento.</li> <li>◆ Siente dolor agudo al respirar.</li> </ul>
<b>Estreñimiento</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene estreñimiento con abdomen duro, sensible e hinchado.</li> <li>◆ Siente dificultad o dolor en el pasaje de las deposiciones que son duras o secas.</li> <li>◆ No evacua sus intestinos durante 3 o más días o hubo un cambio desde el inicio.</li> </ul>

Síntomas	Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias	Llame a su equipo de atención médica: 732-235-2465
<b>Diarrea</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene diarrea constante o incontrolable (&gt; 3 veces por día).</li> <li>◆ Tiene diarrea con fiebre o calambres abdominales.</li> <li>◆ Presenta signos de deshidratación (sed excesiva, aceleración del corazón o latidos con fuerza, mareos, orina de aspecto oscuro o disminución de orina).</li> <li>◆ Desecha heces con sangre u oscuras.</li> </ul>
<b>Fatiga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ No puede despertarse.</li> <li>◆ Tiene letargo (fatiga extrema), dificultad para permanecer despierto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene mareos.</li> <li>◆ Se siente demasiado cansado para salir de la cama o caminar hasta el baño.</li> <li>◆ Tiene falta de aire.</li> <li>◆ La fatiga está empeorando.</li> </ul>
<b>Infección</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene letargo (fatiga extrema), dificultad para despertarse.</li> <li>◆ Pacientes con hematología en pacientes con quimioterapia y luego del trasplante con una temperatura de 100.0 °F o más.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Temperatura de 100.4° °F o más. ***Para pacientes con hematología: 100.0 °F ***Para pacientes trasplantados: 100.0 °F, llame o acuda a la sala de emergencias.</li> <li>◆ Tiene escalofríos, incluso si la temperatura es normal.</li> <li>◆ Orina con frecuencia con o sin ardor o molestias.</li> <li>◆ Tiene tos nueva, dolor de garganta, llagas en la boca o los labios.</li> <li>◆ Tiene mucosidad que se ha tornado verde o amarilla.</li> <li>◆ Tiene dolores de oído, dolores de cabeza, rigidez en el cuello.</li> <li>◆ Siente dolor en los dientes.</li> <li>◆ Tiene cortes que no sanan o que están rojos o inflamados.</li> <li>◆ Tiene picazón o secreción vaginal inusual.</li> <li>◆ Siente dolor o presión sinusal.</li> </ul>
<b>Problemas en la zona de la intervención intravenosa (IV).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene hinchazón o siente dolor en el brazo o alrededor del cuello.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene enrojecimiento o inflamación nuevos alrededor del área de la IV o del dispositivo de acceso venoso.</li> <li>◆ Siente dolor alrededor del port-a-cath®, Hickman®, o en el lugar o área circundante del PICC.</li> </ul>
<b>Llagas en la boca o llagas en la garganta (mucositis o estomatitis)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ No puede tragar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene manchas blancas, llagas o áreas dolorosas dentro o alrededor de la boca.</li> <li>◆ Tiene dificultad para tragar alimentos o líquidos.</li> <li>◆ Tiene sangre roja brillante en la boca.</li> </ul>

<b>Síntomas</b>	<b>Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias</b>	<b>Llame a su equipo de atención médica: 732-235-2465</b>
<b>Náuseas y vómitos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene vómitos con sangre o vómitos que parecen “granos de café”.</li> <li>◆ Lanza chorros de vómitos (vómitos a distancia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene náuseas o vómitos incontrolables.</li> <li>◆ Siente dolor estomacal intenso mientras vomita.</li> <li>◆ No puede tomar medicamentos debido a las náuseas o los vómitos.</li> </ul>
<b>Dolor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Siente dolor agudo en el pecho (opresión o presión en el pecho)</li> <li>◆ Siente dolor de cabeza como si fuese “el peor de su vida”.</li> <li>◆ Siente dolor de espalda con debilidad repentina de las piernas, los brazos o imposibilidad para mover las piernas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Siente dolor nuevo o incontrolable con o sin uso de analgésicos.</li> <li>◆ Experimenta dolores de cabeza incontrolables.</li> <li>◆ Siente ardor en el pecho o el estómago.</li> <li>◆ Tiene dolor abdominal o de espalda nuevo.</li> <li>◆ Siente dolor o presión ocular/dolor sinusal.</li> <li>◆ Siente entumecimiento u hormigueo nuevo en manos o pies.</li> </ul>
<b>Sarpullidos</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene sarpullidos nuevos o experimenta cambios en ellos.</li> <li>◆ Tiene sarpullido con dolor intenso, ampollas o picazón.</li> <li>◆ Enrojecimiento o sensibilidad en las palmas o las plantas de los pies.</li> </ul>
<b>Inflamación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tiene inflamación repentina en cualquier parte del cuerpo con o sin dolor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Experimenta un aumento de la hinchazón.</li> </ul>
<b>Micción</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Intenta pero no puede orinar durante más de 4 horas.</li> <li>◆ Cambio en el color de la orina o detecta sangre en ella.</li> <li>◆ Orina con dolor.</li> <li>◆ Orina con olor fuerte.</li> <li>◆ Presenta un flujo débil o goteo al orinar.</li> </ul>

**Si tiene alguna pregunta sobre los síntomas, llame a su equipo de atención médica al 732-235-2465 entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m.**

**Las llamadas recibidas después de las 5:00 p. m. se transferirán a un proveedor de atención médica.**

**Si necesita ayuda de inmediato, llame al 732-235-2465 y seleccione la opción que mejor satisfaga sus necesidades.**